



МОСКОВСКИЙ  
ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ  
ИНСТИТУТ

ОЛИМПИАДА "ФИЗТЕХ"  
ПО МАТЕМАТИКЕ

11 КЛАСС. Вариант 3



1. [4 балла] Натуральные числа  $a, b, c$  таковы, что  $ab$  делится на  $2^8 3^{14} 5^{12}$ ,  $bc$  делится на  $2^{12} 3^{20} 5^{17}$ ,  $ac$  делится на  $2^{14} 3^{21} 5^{39}$ . Найдите наименьшее возможное значение произведения  $abc$ .
2. [5 баллов] Дан прямоугольный треугольник  $ABC$ . Окружность, касающаяся прямой  $BC$  в точке  $B$ , пересекает высоту  $CD$ , проведённую к гипотенузе, в точке  $F$ , а катет  $AC$  – в точке  $E$ . Известно, что  $AB \parallel EF$ ,  $AD : DB = 5 : 2$ . Найдите отношение площади треугольника  $ABC$  к площади треугольника  $CEF$ .
3. [4 балла] Решите уравнение  $10 \arcsin(\cos x) = \pi - 2x$ .
4. [5 баллов] Найдите все значения параметра  $a$ , для каждого из которых найдётся значение параметра  $b$ , при котором система уравнений

$$\begin{cases} ax - 3y + 4b = 0, \\ (x^2 + y^2 - 1)(x^2 + y^2 - 20y + 64) = 0 \end{cases}$$

имеет ровно 4 решения.

5. [5 баллов] Некоторые числа  $x$  и  $y$  удовлетворяют равенствам

$$\log_5^4(2x) - 3 \log_{2x} 5 = \log_{8x^3} 625 - 3, \quad \text{и} \quad \log_5^4 y + 4 \log_y 5 = \log_{y^3} 0,2 - 3.$$

Найдите все возможные значения произведения  $xy$ .

6. [5 баллов] На координатной плоскости дан параллелограмм с вершинами в точках  $O(0; 0)$ ,  $P(-16; 80)$ ,  $Q(2; 80)$  и  $R(18; 0)$ . Найдите количество пар точек  $A(x_1; y_1)$  и  $B(x_2; y_2)$  с целыми координатами, лежащих в этом параллелограмме (возможно, на границе) и таких, что  $5x_2 - 5x_1 + y_2 - y_1 = 45$ .
7. [6 баллов] Дана треугольная пирамида  $SABC$ , медианы  $AA_1$ ,  $BB_1$  и  $CC_1$  треугольника  $ABC$  пересекаются в точке  $M$ . Сфера  $\Omega$  касается ребра  $AS$  в точке  $L$  и касается плоскости основания пирамиды в точке  $K$ , лежащей на отрезке  $AM$ . Сфера  $\Omega$  пересекает отрезок  $SM$  в точках  $P$  и  $Q$ . Известно, что  $SP = MQ$ , площадь треугольника  $ABC$  равна 100,  $SA = BC = 16$ .
  - а) Найдите произведение длин медиан  $AA_1$ ,  $BB_1$  и  $CC_1$ .
  - б) Найдите двугранный угол при ребре  $BC$  пирамиды, если дополнительно известно, что  $\Omega$  касается грани  $BCS$  в точке  $N$ ,  $SN = 4$ , а радиус сферы  $\Omega$  равен 5.

На одной странице можно оформлять только одну задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,  
решение которой представлено на странице:

1  2  3  4  5  6  7



Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,  
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



III. и.  $ac : 2^{14}$ ,  $mo\ abc : 2^{14}$

III. и.  $ac : 3^{21}$ ,  $mo\ abc : 3^{21}$

IV. и.  $ac : 5^{39}$ ,  $mo\ abc : 5^{39}$

III. и.  $mo\ abc > 0$

$u\ abc \geq 2^{14} \cdot 3^{21} \cdot 5^{39}$

Пусть  $a = 2^{\alpha_1} \cdot 3^{\beta_1} \cdot 5^{\gamma_1} \cdot A$ ,  $b = 2^{\beta_1} \cdot 3^{\alpha_2} \cdot 5^{\gamma_2} \cdot B$ ,

$c = 2^{\delta_1} \cdot 3^{\beta_2} \cdot 5^{\gamma_3} \cdot C$ , где  $\alpha_i, \beta_i, \gamma_i \in \mathbb{Z}$  и не меньше 0.  
 $A, B, C \in \mathbb{N}$ , но не кратны  $\{2, 3, 5\}$ .

III. и.  $u_3$  условие:

$$\begin{cases} \alpha_1 + \beta_1 \geq 8, & \alpha_1 + \gamma_1 \geq 14, & \beta_1 + \gamma_1 \geq 12, \\ \alpha_2 + \beta_2 \geq 14, & \alpha_2 + \gamma_2 \geq 21, & \beta_2 + \gamma_2 \geq 20, \\ \alpha_3 + \beta_3 \geq 12, & \alpha_3 + \gamma_3 \geq 39, & \beta_3 + \gamma_3 \geq 17. \end{cases}$$

$\alpha_1 = 5, \beta_1 = 3, \gamma_1 = 9$   
 $\alpha_2 = 12, \beta_2 = 0, \gamma_2 = 17$   
 $\alpha_3 = 8, \beta_3 = 6, \gamma_3 = 14$

- условие выполнено невозможно

Докажем, что  $abc : 2^{17} \cdot 3^{28} \cdot 5^{39}$

III. и.  $ac : 5^{39}$ ,  $mo\ abc : 5^{39}$ .

IV. и.  $(\alpha_2 + \beta_2) + (\alpha_2 + \gamma_2) + (\beta_2 + \gamma_2) \geq 14 + 21 + 20$

$2(\alpha_2 + \beta_2 + \gamma_2) \geq 55$ ,  $mo$

$\alpha_2 + \beta_2 + \gamma_2 \geq 27,5$

$abc : 3^{\alpha_2 + \beta_2 + \gamma_2}$ ,  $mo\ x. \alpha_2, \beta_2, \gamma_2 = \text{целые}$ ,  $mo$   
 $\alpha_2 + \beta_2 + \gamma_2 \geq 28$  и  $abc : 3^{28}$ .

V. и.  $(\alpha_1 + \beta_1) + (\alpha_1 + \gamma_1) + (\beta_1 + \gamma_1) \geq 8 + 14 + 12$ ,  $mo$

$2(\alpha_1 + \beta_1 + \gamma_1) \geq 34$ ,  $\alpha_1 + \beta_1 + \gamma_1 \geq 17$

$abc : 2^{\alpha_1 + \beta_1 + \gamma_1}$ ,  $знаем, abc : 2^{17}$ .

Значит,  $abc : 2^{17} \cdot 3^{28} \cdot 5^{39}$

III. и.  $abc \geq 2^{17} \cdot 3^{28} \cdot 5^{39}$

Равенство достигается при  $a = 2^5 \cdot 3^{12} \cdot 5^8$

$b = 2^3 \cdot 3^6$  и  $c = 2^9 \cdot 3^{17} \cdot 5^{24}$

$a = 2^5 \cdot 3^8 \cdot 5^{12}$ ,  $b = 2^3 \cdot 3^6$ ,  $c = 2^9 \cdot 3^{14} \cdot 5^{17}$

Ответ:  $abc = 2^{17} \cdot 3^{28} \cdot 5^{39}$


На одной странице можно оформлять только одну задачу.

Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице:

1  2  3  4  5  6  7




Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



$AB \parallel \varepsilon$   
 $AB \parallel EF$   
 $AD:DB = 5:2$



$S_{\triangle ABC} : S_{\triangle CEF}$



Решение.

Т.к. дуга  $\varepsilon$  окружности является описанной около  $\triangle BFE$  и  $BC$  — касательная к ней, то  $\angle BEF = \angle EBC$  (оба опираются на дугу  $BE$ ).

Т.к.  $EF \parallel AB$ , то  $\angle BEF = \angle ABE$  (как соответственные углы при  $AB \parallel EF$  и секущей  $BE$ ).



Т.к.  $EF \parallel AB$ , то  $\angle CFE = \angle CBA = 90^\circ$ .

(1) Т.к.  $CD$  — высота, то  $\triangle CDB \sim \triangle ACB$  ( $\angle CBA$  — общий,  $\angle CDB = \angle ACB = 90^\circ$ ). Значит,  $\angle DCB = \angle CAB$ .

(2) Т.к.  $\angle CBF = \angle EBA$ ,  $\triangle CDB \sim \triangle ACB$ , то  $\angle DCB = \angle CAB$ , то  $\triangle CFB \sim \triangle AEB$ .

Тогда, из (2)  $\frac{AE}{CF} = \frac{AB}{CB}$ , из (1)  $\frac{AC}{CD} = \frac{AB}{CB}$ .

Значит,  $\frac{AE}{CF} = \frac{AC}{CD} = \frac{AE+EC}{CF+FD}$ .

$AE(CF+FD) = (AE+EC)CF$

$AE \cdot FD = EC \cdot CF \Rightarrow \frac{EC}{AE} = \frac{FD}{CF}$

Т.к.  $EF \parallel AD$ , то  $\triangle CEF \sim \triangle CAD$  ( $\angle ACD$  — общий,

$\angle EFC = \angle ADC = 90^\circ$ ). Тогда,  $\frac{CE}{AC} = \frac{CF}{CD}$  (3)

$\frac{AC}{CE} = \frac{CD}{CF}$

$\frac{AC}{CE} = \frac{AE+EC}{CE} = \frac{AE}{EC} + 1$

На одной странице можно оформлять только одну задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,  
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,  
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

$$\frac{CD}{CF} = \frac{CE+FD}{CF} = \frac{FD}{CF} + 1$$

Значит,  $\frac{FD}{CF} + 1 = \frac{AE}{EC} + 1$

$$\frac{FD}{CF} = \frac{AE}{EC}$$

Т.к.  $\frac{FD}{CF} = \frac{AE}{EC}$  и  $\frac{FD}{CF} = \frac{EC}{AE}$  (из (3)),

то  $\frac{AE}{EC} = \frac{EC}{AE} \Rightarrow AE = EC$ .

Значит,  $FD = CF$ . Т.к.  $E$  и  $F$  - середины  
 $AC$  и  $CD$  соответственно.

Тогда,  $S_{CEF} = \frac{1}{4} S_{ACD}$  ( $EF$  - средняя линия  $\triangle ACD$ ).

Т.к.  $AD : DB = 5 : 2$ , то  $DB = \frac{2}{5} AD$

$$S_{ABC} = S_{ADC} + S_{CDB} = \frac{1}{2} CD (AD + DB) =$$
$$= \frac{1}{2} CD \cdot AD \left(1 + \frac{2}{5}\right) = \frac{7}{10} CD \cdot AD.$$

$$S_{ADC} = \frac{1}{2} CD \cdot AD.$$

$$S_{CEF} = \frac{1}{4} S_{ADC} = \frac{1}{8} CD \cdot AD.$$

$$\frac{S_{ABC}}{S_{CEF}} = \frac{\frac{7}{10} CD \cdot AD}{\frac{1}{8} CD \cdot AD} = \frac{7 \cdot 8}{10} = 5,6.$$

Ответ:  $S_{ABC} : S_{CEF} = 56 : 10$

или же  $\frac{S_{ABC}}{S_{CEF}} = 5,6$ .

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,  
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,  
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

$$\text{10 } \arcsin(\cos x) = \pi - 2x$$

$\cos x$  имеет период  $2\pi$        $\cos 0 = 1$   
 $\cos 2\pi = 1$

~~Найдем решение на  $\cos(\frac{\pi}{2}) = \cos \frac{\pi}{2} - \sin \frac{\pi}{2}$~~

Положим  $f(x) = \arcsin(\cos x)$  — периодическая с периодом  $2\pi$

$g(x) = \pi - 2x$  — строго убывающая функция

$\arcsin y$  — дает значения значения  
из промежутка  $[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$ .

Поэтому, ~~тогда~~  $f(x)$  принимает  
значения только из отрезка  $[-5\pi; 5\pi]$ .

$g(x) = \pi - 2x$  принимает значения  $[-5\pi; 5\pi]$   
только при  $x \in [-2\pi; 3\pi]$ .

Значит, решение  $f(x) = g(x)$  есть  
могут быть только на  $[-2\pi; 3\pi]$ .

Сделаем замену переменной  
пусть  $x = -y + \frac{\pi}{2}$

Тогда,  $\pi - 2x = 2y$ ;       $\cos x = \cos(\frac{\pi}{2} - y) = \sin y$ ,

$$\text{10 } \arcsin(\sin y) = 2y.$$

$$\arcsin(\sin y) = y - \pi n, \quad n \in \mathbb{Z}, \quad \text{и т.д. } y - \pi n \in [-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}].$$

$$\text{10 } \arcsin(\sin y) = 2y \Rightarrow 2y = 2\pi n \Rightarrow y = \pi n$$

т.е.  $\arcsin(\sin y) \in [-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$ , но

решение  $2y \in [-5\pi; 5\pi]$ , т.е.  $y \in [-2,5\pi; 2,5\pi]$ .

Положим  $y = \pi n$ ,  $\pi n \in [-2,5\pi; 2,5\pi]$ ,  $n \in [-2; 2]$ .

Рассмотрим все  $n \in [-2; 2]$ .

$n = -2$ ,       $y = -2,5\pi$ ,       $\sin(-2,5\pi) = \sin(-\frac{\pi}{2}) = -1$   
 $\text{10 } \arcsin(-1) = -\frac{\pi}{2}$        $2y = -5\pi$        $n = -2$  — решение.

На одной странице можно оформлять только одну задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,  
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,  
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

$$n = -1. \quad y = -\frac{5}{4}\pi. \quad \sin y = +\frac{\sqrt{2}}{2}.$$
$$10 \arcsin\left(+\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = 10 \cdot \left(+\frac{\pi}{4}\right) = +2,5\pi.$$

$$2y = -2,5\pi.$$

Значит,  $n = -1$  не решение.  
 $n = 0$

$$y = 0 \quad 2y = 0 \quad \sin(y) = 0$$
$$10 \arcsin(0) = 10 \cdot 0 = 0$$

$n = 0$  — решение

$$n = 1.$$

$$y = \frac{5}{4}\pi \quad 2y = 2,5\pi \quad \sin y = -\frac{\sqrt{2}}{2}.$$
$$10 \arcsin\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = -10 \cdot \frac{\pi}{4} = -2,5\pi.$$

$n = 1$  — не решение

$$n = 2.$$

$$10 \arcsin 1 = 10 \cdot \frac{\pi}{2} = 5\pi \quad 2y = 5\pi \quad \sin y = 1.$$

$n = 2$  — решение

$$n = \{-2; 0; 2\} \text{ — решение}$$
$$y = \{-2,5\pi; 0; 2,5\pi\}.$$

$$x = -y + \frac{\pi}{2}$$

$$x = \{-2\pi; \frac{\pi}{2}; 3\pi\}.$$

Ответ:  $x \in \{-2\pi; \frac{\pi}{2}; 3\pi\}.$

1  2  3  4  5  6  7

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



$$\begin{cases} ax - 3y + 4b = 0 \\ (x^2 + y^2 - 1)(x^2 + y^2 - 20y + 64) = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} ax - 3y + 4b = 0 \\ \begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ x^2 + (y-10)^2 = 36 \end{cases} \end{cases}$$

$ax - 3y + 4b = 0$  — уравнение прямой

$\omega_1$ :  $x^2 + y^2 = 1$

$\omega_2$ :  $x^2 + (y-10)^2 = 36$


— уравнение

окружностей  $\omega_1$  и  $\omega_2$

Сначала решим систему уравнений в виде точек пересечения окружностей и прямой с

прямой и с окружностью. Решения должны быть и тогда, когда прямая пересекает окружность

дважды.



Т.к. центр 1 окружности —  $O(0;0)$  и ее радиус  $r=1$ , а центр второй окружности —  $Q(0;10)$ , а ее радиус  $R=6$ , то  $OQ=10$  и  $r+R=7$ .  
 $ax - 3y + 4b = 0$ ,  $3y = ax + 4b$   
 $y = \frac{a}{3}x + \frac{4b}{3}$

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.


Отметьте крестиком номер задачи,

решение которой представлено на странице:

1   
  2   
  3   
  4   
  5   
  6   
  7



Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



Т.к. прямая задается как  $y = \frac{a}{3}x + \frac{4}{3}b$ , то  
 а — определены наклон, а b — точку  
 пересечения с Oy. Заметим  $\frac{a}{3}$  на A,  $\frac{4}{3}b$  на B.  
 Значит, мы сможем найти также A, т.к.  
 из множества прямых параллельных  $y = Ax$   
 хотя бы две одна пересекать, без окружности.  
 Докажем, что ~~эти~~  $\exists$  прямые касан A  
 задают прямые касаются ~~кас~~  $\neq$   
 имеют наклон больший, чем у внешней  
 точки касательной с той же осью абсцисс  
 на касан и наклон меньше, чем  
 у внутренней касательной  
 с отрицательным изгибом.  
 (  $\left[ \begin{array}{l} A > k_1 \\ A < k_2 \end{array} \right]$ , где  $y = k_1x + b_1$  и  $y = k_2x + b_2$   
 касательные ).



На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,

решение которой представлено на странице:



1	2	3	4	5	6	7
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

Если  $0 \leq A \leq k$ , то т.к.  $y = kx + b_1$  —  
одна из внутренних касательных, то  
при  $B \leq b_1$   $y = Ax + B$  ~~то~~  
или не пересекает  $\omega_2$  или  
касается  $\omega_2$ . А значит, наше  
предположение не верно и решение  
(пересечение уже не больше 3).  
( $B$  отсутствию двух пересечений  
почему убедиться знаем, что  
 $\alpha$  (от точки на рисунке) уменьшается  
при ~~убавлении~~ ~~тогда~~  $M$  от  
— угла между  $Oy$  и касательной из  $M$   
уменьшается при ~~увеличении~~ ~~тогда~~  
 $M$  вниз по  $Oy$  ( $\sin \alpha = \frac{R}{QM}$ ,  
 $QM$  — расстояние, значит  $\alpha$  — уменьшается),  
а тем меньше  $\alpha$  тем больше  
угол наклона  $y$  касательной из  $M$ .  
Тогда,  $y = Ax + B$  не может быть касательной  
при  $B < b_1$ , так и не пересекает  $\omega_2$   
 $B$  двух точек (наклон прямой не  
меньше касательной), а при  $B_2 = b_1$ ,  
 $y = Ax + B$  не ~~да~~ ~~на~~ ~~касается~~ не может  
быть прямой, значит,  $y = Ax + B$   
при  $0 \leq A \leq k$ ,  $B \leq b_1$  имеет  
 $C \in \omega_2$  не более одной точки  
возмож).  
С другой стороны при  $B > b_1$ ,  
 $y = Ax + B$  имеет не более одной  
общей точки с  $\omega_1$  (ситуация  
аналогичная с  $\omega_2$ ) ~~кроме~~ ~~того~~  
значит,  $A$  должен быть не меньше  
 $k_2$  больше  $k$ ,  
При  $k_2 \leq A \leq k$  все ~~тоже~~ ~~самое~~  
т.к. ситуация симметрична,  
заранее известно относительно  $Oy$  что  
случае  $0 \leq A \leq k$ .

На одной странице можно оформлять только одну задачу.

Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице:

1  2  3  4  5  6  7

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



III вариант,  $A \leq k_2$ .

III вариант  
 при  $A > k_1$  будут сечущей  
 для обеих окружностей  
 но если же при этом, то и  
 имеет не более одной общей точки  
 если  $0 \leq A \leq k_1$ ,  
 диаметрально  $y = Ax + b_2$  при  $A < k_2$   
 то же сечущей и обеих  
 окружностей.

Отсюда следует условия  $k_1$  и  $k_2$ .  
 Из результатов выше следует, что  
 обе касательные пересекутся на OQ,  
 т.е. на Oy.

III вариант  
 $\sin d = \frac{r}{10-b}$ ,  $\sin(90^\circ - d) = \frac{r}{b_1 - 0}$  т.к.  
 касательные

$\sin d = \frac{r}{10-b}$ ,  $\sin d = \frac{r}{b_1 - 0}$  т.к.

касательные перпендикулярны  
 радиусам M имеет координаты  $(0; b_1)$ .

$\frac{r}{10-b} = \frac{r}{b_1}$ ,  $\frac{b}{10-b} = \frac{r}{b}$ ,  $b^2 = 10-b$   
 $2b = 10$

$b = \frac{10}{2}$ ,  $\sin d = \frac{1}{\frac{10}{b}} = \frac{r}{b}$

$k_1 = \tan(90^\circ - d) = \frac{\sin(90^\circ - d)}{\cos(90^\circ - d)} = \frac{\cos d}{\sin d}$   
 $= \frac{\sin 90^\circ \cos d - \cos 90^\circ \sin d}{\cos 90^\circ \cos d + \sin 90^\circ \sin d} = \frac{\cos d}{\sin d}$

т.к.  $d$  - острый, то  $\cos d = \sqrt{1 - \frac{r^2}{10^2}} = \frac{\sqrt{51}}{10}$

$k_1 = \frac{\frac{\sqrt{51}}{10}}{\frac{1}{2}} = \frac{\sqrt{51}}{2}$

$k_2 = -k_1$ , из симметрии.

значит,  $\left[ \begin{matrix} a > \frac{3\sqrt{51}}{2} \\ a < -\frac{3\sqrt{51}}{2} \end{matrix} \right]$ ,  $\left[ \begin{matrix} \frac{a}{3} > \frac{\sqrt{51}}{2} \\ \frac{a}{3} < -\frac{\sqrt{51}}{2} \end{matrix} \right]$

Ответ:  $a \in (-\infty; -\frac{3\sqrt{51}}{2}) \cup (\frac{3\sqrt{51}}{2}; +\infty)$ .

На одной странице можно оформлять только одну задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,

решение которой представлено на странице:



1  2  3  4  5  6  7



Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

$$\log_5^4(2x) - 3\log_{2x} 5 = \log_{0,2x} 0,25 - 3$$

$$\log_5^4 y + 4\log_y 5 = \log_{y^3} 0,2 - 3$$

из данных равенств ясно, что  
 $2x > 0$ ,  $y > 0$  и т.д.  $x > 0$  и  $y > 0$ .  
 $0,25 = 5^4$   $\log_{0,2x} 0,25 = \frac{4}{3} \log_{2x} 5$   $\log_{y^3} 0,2 = \frac{1}{3} \log_{y^{-1}} 0,2$

$$\log_5^4(2x) - 3 \cdot \frac{1}{\log_5 2x} = \frac{4}{3} \log_5 2x - 3$$

$$\log_5^4 y + 4 \cdot \frac{1}{\log_5 y} = -\frac{1}{3} \log_5 y - 3$$

$$\frac{\log_5^5 2x - 3 - \frac{4}{3} + 3\log_5 2x}{\log_5 2x} = 0$$

$$\frac{\log_5^5 y + 4 + \frac{1}{3} + 3\log_5 y}{\log_5 y} = 0$$

$$\log_5^5 2x + 3\log_5 2x - \frac{13}{3} = 0$$

$$\log_5^5 y + 3\log_5 y + \frac{13}{3} = 0$$

Значит,  $\log_5^5 2x + 3\log_5 2x = -\log_5^5 y + 3\log_5 y$ .

$\log_5 y = B$ ,  $\log_5 2x = A$   
 $A^5 + 3A = -(B^5 + 3B)$

$A^5 + 3A$  - строго возрастающая  
 $-B^5 - 3B$  - строго убывающая

Значит, решение для данных уравнений  
 $A = -B$  - решение.

Значит,  $\log_5 2x = -\log_5 y$ .

$$\log_5 2x + \log_5 y = \log_5 2xy = 0$$

$$2xy = 1$$
$$xy = \frac{1}{2}$$

Ответ:  $xy = \frac{1}{2}$ .

На одной странице можно оформлять только одну задачу.

Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице:

1  2  3  4  5  6  7



Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



$$O(0;0) \rightarrow (0;0;0)$$

$$P(-10; 80) \rightarrow (-80; 80)$$

$$Q(2; 80) \rightarrow (10; 80)$$

$$R(18; 0) \rightarrow (90; 80)$$

Точка  $M(x; y)$  внутри параллелограмма  
 будет ~~при движении~~ иметь  
 целые координаты в узлах  
 системы ссы  $x \in Z, y \in Z$ .

Тогда, условные  $5x_2 + y_2 - 5x_1 - y_1 = 45$   
 превращается в  $x_2 + y_2 - x_1 - y_1 = 45$ .

Т.о. для точки  $A$  в новом  
 параллелограмме можно найти  
 ко-ва. точки  $B$  там же т.о.  
 суммы координат  $B$  на  $45$  больше  
 суммы координат  $A$  и  $x_2 \in Z, y_2 \in Z$ .  
 Т.е.  $x_1 \in Z, x_2 \in Z$ , т.о.  $y_2 - y_1 \in Z$   
 (т.е.  $45 \in Z$ ).

Т.к.  $x_2 - x_1 + y_2 - y_1 = 45$ ,

то для  $A(x_1; y_1)$   
 $x - x_1 + y - y_1 = 45$

Если перенести начало  $(0;0)$   
 в  $A$ , то  $x + y = 45$   
 $y = 45 - x$

Значит, решение  
 принадлежит прямой  
 параллельной  
 $y = 45 - x$ .

а эти прямые  
 параллельны  
 $QR$  и  $PO$ .


Расстояние от  $A$  до этой прямой равно  
 $\frac{45 \cdot 45}{\sqrt{45^2}} = \frac{45}{2}$ . Тогда, если  $A$  правее  $l$ , где  $P(l; 80), Q(10; 80)$ .

то решение нет.

При движении  $A$  по прямой параллельной  $QR$ ,

форма решения не меняется. Значит, можно

рассматривать только прямую  $QR$ . Ответ:  $12 \cdot 18$



На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.


Отметьте крестиком номер задачи,

решение которой представлено на странице:

1  2  3  4  5  6  7



Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



Заметим, что прямая  
QR задается уравнением

$$y = -5x + 90.$$

Прямая PO :  $y = -5x$   
а OR и PQ параллельны  $Ox$ .

П.к.  $5x_2 + y_2 - 5x_1 - y_1 = 45$

Посмотрим какое максимумное

значение принимает  $5x_2 + y_2$  при

внутри параллелограмма  $PQRO$ ,  $y_2$  — вертикальная.

П.к. точки  $(x_2, y_2)$  лежат внутри  $PQRO$ ,

то  $(x_2, y_2)$  лежит с левой стороны от  $QR$ . П.о. при неубывании  $y_2$ ,

$$y_2 = -5x + 90, \quad x \geq x_2$$

$$x = \frac{y_2 - 90}{-5} = 18 - \frac{y_2}{5}$$

$$x_2 \leq 18 - \frac{y_2}{5}$$

Тогда,  $5x_2 + y_2 \leq 5(18 - \frac{y_2}{5}) + y_2 = 90$ .  
 $y_2$  не больше 80 п.к.  $PQ$  имеет  
не менее  $(x_2, y_2)$ , а  $PQ$  задается  
как  $y = 80$ .

Тогда,  $x_2 + y_2 \leq 18 + \frac{4 \cdot 80}{5} = 18 + 64 = 82$

П.к.  $(x_2, y_2)$  лежит справа от  $PO$ , то

$$y_2 = -5x, \quad x \leq x_2$$

$$x_2 \geq -\frac{y_2}{5}$$

Заметим, ищем точки заданные

$$\begin{cases} 0 \leq y_2 \leq 80 \\ -\frac{y_2}{5} \leq x_2 \leq 18 - \frac{y_2}{5} \end{cases}$$

Для точек  $A(x_1, y_1)$  и  $B(x_2, y_2)$   
рассмотрим направление отрезка  
в 5 раз по оси  $x$ .


На одной странице можно оформлять только одну задачу.

Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице:

- 1  2  3  4  5  6  7

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



$$SP = MQ \quad SA = 16$$

$$S_{ABC} = 100 \quad BC = 16$$

Точки  $L, P, Q, K$  лежат в одной плоскости, которая задается прямой  $AM$  и  $SA$ .

т.е. эти четыре точки лежат в одной

плоскости. Точки  $L, P, Q, K$  лежат на одной окружности. т.е. сфера касается  $AM$  и  $SA$  (в точке  $K \in AM$ ), то окружность касается  $AS$  в  $L$  и  $AM$  в  $K$ .

Тогда считаем точки  $M$  равна  $MK^2$  и  $MQ \cdot MP =$   
 $= MQ \cdot (MQ + QP)$  т.е.  $MP =$   
 длину окружности

Считаем точки  $S$  равна  $SL^2$  и  
 $SP \cdot SQ = SP(SP + PQ)$ .

т.е.  $SP = MQ$ , то  $MQ(MQ + QP) = SP(SP + PQ)$ .

Значит, считаем точки  $M$  и  $S$  одинаково окружности равны.

Значит,  $MK^2 = SL^2$ ,  $MK = SL$ .

Также можем считать длину отрезка  $AK$  отрезка  $AS$  окружности. Она равна  $AL^2$  и  $AK^2$  ( $L$  и  $K$  - точки касания). Значит,  $AL = AK$ .

Тогда,  $AK + KM = AL + LS = AS$ .

Значит,  $AM = SA = BC = 16$ .

т.е.  $M$  делит  $AA_1$  в отношении  $2:1$ ,  
 то  $AA_1 = \frac{3}{2} AM = 24$ .

$S_{ABC} = \frac{1}{2} AA_1 \cdot BC \cdot \sin(\angle AA_1B) = 24 \cdot 16 \cdot \frac{1}{2} \cdot \sin \alpha = 100$   
 $24 \cdot 8 \cdot \sin^2 \alpha = 100$   $\sin^2 \alpha = \frac{100}{182}$


На одной странице можно оформлять только одну задачу.

Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице:

- 1  2  3  4  5  6  7

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



Заметим, что  $MA_1 = \frac{1}{2} AA_1 = 8$ .  
 $BA_1 = A_1C = \frac{1}{2} BC = 8$ .

Значит,  $MA_1$  - медиана равная по длине стороне и которой

угол  $\alpha$  вершен. Значит,  $\triangle BMC$  - прямоугольный.

Т.к.  $\sin \alpha = \frac{100}{192}$

$\begin{matrix} \times 24 \\ 15 \\ \hline 120 \\ 24 \\ \hline 360 \end{matrix}$

$\sin(\angle MBA_1) = \sin(90^\circ - \frac{\alpha}{2})$   
 равнобедренный ( $MA_1 = BA_1$ ).

$\frac{100}{192} = \frac{50 \cdot 25}{96 \cdot 48}$   
 $(50 \cdot 2) = 2500 - 200 + 4$   
 $\frac{2304}{1679}$

Т.к.  $\sin \alpha = \frac{100}{192}$ , то  $\cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{100 \cdot 100}{192 \cdot 192}}}$   
 $= \frac{1}{\sqrt{\frac{2304}{2304} - \frac{625}{2304}}} = \frac{\sqrt{1679}}{48}$

Т.к.  $\triangle BMC$  - равнобедренный, то  $\angle BMA_1$  и  $\angle A_1CM$  тупые углы  $\angle BMA_1$  и  $\angle A_1CM$  (без обращения внимания на то, что  $\angle BMA_1 < \angle A_1CM$ ).

$BM^2 = 8^2 + 8^2 - 2 \cdot 8^2 \cdot \frac{\sqrt{1679}}{48} =$

$= 128 \left( 1 - \frac{\sqrt{1679}}{48} \right)$

$CM^2 = 128 \left( 1 + \frac{\sqrt{1679}}{48} \right)$

$CC_1 = \frac{3}{2} CM = \frac{3}{2} \sqrt{CM^2}$

$BB_1 = \frac{3}{2} \sqrt{BM^2}$

$CC_1 \cdot BB_1 = \frac{9}{4} \cdot \sqrt{128 \cdot 128 \cdot \left( 1 - \frac{\sqrt{1679}}{48} \right) \left( 1 + \frac{\sqrt{1679}}{48} \right)}$   
 $= \frac{9}{4} \cdot 128 \cdot \sqrt{1 - \frac{1679}{48^2}} = 9 \cdot 32 \cdot \sqrt{\frac{625}{48^2}} = 9 \cdot 32 \cdot \frac{25}{48} =$

$= 6 \cdot 25 = 150$

$AA_1 \cdot CC_1 \cdot BB_1 = 24 \cdot 150 = 3600$

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.


Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице:

1  2  3  4  5  6  7



Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

8)



~~Т.к.  $\alpha$  касается пирамиды в плоскости  $L, N, K$   
 Т.к.  $L, N, K$  принадлежат  $\alpha$  и  $\alpha$  касается пирамиды в одной плоскости  $\alpha$   
 Т.к.  $\alpha$  касается  $(SBC)$  в точке  $N$ ,  $\alpha$  касается  $AS$  в точке  $L$ , то стороны  $SL^2$  и  $SN^2$  равны, значит,  $SL = SN = 4$ .~~

В пункте (а) мы получим, что  $AL = AK$ ,  $SL = KM$ ,  $AS = AM$  значит,  $\frac{AL}{AS} = \frac{AK}{AM} = \frac{AK}{AS}$

Тогда,  $LK \parallel SM$ .

Рассмотрим плоскость  $\alpha$  и  $\alpha$  касается пирамиды в плоскости  $L, N, K$  и  $SM \cap SN = S$ , то  $SM$  лежит в этой плоскости.

Тогда, точки  $L, K, P, Q, N$  лежат в одной плоскости  $\alpha$  и т.д.

Все эти точки принадлежат сфере и одной плоскости, то они все на одной окружности.

При этом  $SN$  касается этой окружности в  $N$ .

Следовательно, точки  $S$  относительно этой окружности равны  $SL^2$  и  $SN^2$ .




1  2  3  4  5  6  7

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



Тогда  $SN = SL = 4$ .



Теперь, если мы найдем  $KN$ , то из  $\triangle KON$ , где  $O$  - центр сферы найдем  $\angle KON$ , а искомый угол двух плоскостей между  $(SBC)$  и  $(ABE)$  равен  $180^\circ - \angle KON$ .

Т.к.  $SN \subset (ASM)$ , то  $AM \cap BC = SN \cap BC$ , т.к.  $(ASM)$  пересекает  $BC$  в одной точке.

Тогда,  $SN$  - медиана в  $\triangle SBC$ , база  $SN$  проходит через  $A_1$ .

Поэтому точки  $A_1$  симметричны относительно прямой  $AK$  и окружности с тем же радиусом.

$$A_1N^2 = AA_1^2 - AK^2 = A_1K^2 \quad \text{т.к.} \quad A_1N = A_1K = 24 - 12 = 12.$$

Тогда,  $SA_1 : NA_1 = SL : AL = 4 : 12$  ( $AL = SA - SL = 16 - 4 = 12$ ).

Тогда,  $\angle N \parallel AA_1$ .

$$AA_1 = 24, \quad SA = 16, \quad SA_1 = 12 + 4 = 16.$$

$\triangle SAA_1$  - равнобедренный

Т.к.  $\cos(\angle SA_1K) = \frac{A_1K}{SA_1} = \frac{12}{16}$  (т.к.

$AK = 12, \quad KA_1 = 6$ , то  $SK$  - медиана, а значит, высота).

По теореме косинусов для  $\triangle KA_1N$ :

$$KN^2 = NA_1^2 + A_1K^2 - 2 \cdot A_1K \cdot NA_1 \cdot \cos(\angle SA_1K) = 12^2 + 12^2 - 2 \cdot 12 \cdot 12 \cdot \frac{12}{16} = 144 \cdot 2 \left(1 - \frac{12}{16}\right) = \frac{4}{16} \cdot 2 \cdot 144 = 82. \quad KN = \sqrt{82} = 3 \cdot 2\sqrt{2} = 6\sqrt{2}.$$

Т.к. в  $\triangle KON$ ,  $OK$  и  $ON$  - радиусы, то  $KO = ON = 5$ . По теореме косинусов.

$$KN^2 = OK^2 + ON^2 - 2 \cdot OK \cdot ON \cdot \cos(\angle KON) =$$

$$= 2 \cdot 25 - 2 \cdot 25 \cdot \cos(\angle KON) = 6\sqrt{2}$$

$$5 \cdot (1 - \cos(\angle KON)) = 6\sqrt{2} \quad 1 - \cos(\angle KON) = \frac{6\sqrt{2}}{25}$$

$$\cos(\angle KON) = \frac{25 - 6\sqrt{2}}{25}. \quad \text{Ответ: а) } 360^\circ; \text{ б) } 180^\circ - \arccos\left(\frac{25 - 6\sqrt{2}}{25}\right).$$