




Олимпиада «Физтех» по физике,  
февраль 2023

Вариант 10-02

Во всех задачах, в ответах допустимы обыкновенные дроби и радикалы.



1. Футболист наносит удар по мячу, лежащему на горизонтальной площадке. Вектор начальной скорости мяча образует угол  $\alpha = 45^\circ$  с горизонтальной плоскостью. Горизонтальное перемещение мяча за время полета  $L = 20$  м.

1) Найдите начальную скорость  $V_0$  мяча.

Если футболист направляет мяч под различными углами к горизонту, из той же точки с начальной скоростью  $V_0$  к высокой вертикальной стенке, то наибольшая высота, на которой происходит соударение мяча со стенкой, равна  $H = 3,6$  м.


2) На каком расстоянии  $S$  от точки старта находится стенка?

Ускорение свободного падения  $g = 10$  м/с<sup>2</sup>. Мяч движется в плоскости перпендикулярной стенке. Сопротивление воздуха считайте пренебрежимо малым.

2. Лента транспортера, предназначенного для подъема грузов, образует с горизонтальной плоскостью угол  $\alpha$  такой, что  $\sin \alpha = 0,6$  (см. рис.).

В первом опыте небольшую коробку ставят на покоящуюся ленту транспортера и сообщают коробке начальную скорость  $V_0 = 6$  м/с. Коэффициент трения скольжения коробки по ленте  $\mu = 0,5$ .

Движение коробки прямолинейное.



1) Какой путь  $S$  пройдет коробка в первом опыте к моменту времени  $T = 1$  с?

Во втором опыте коробку ставят на ленту транспортера, движущуюся со скоростью  $U = 1$  м/с, и сообщают коробке скорость  $V_0 = 6$  м/с (см. рис.).


2) Через какое время  $T_1$  после старта скорость коробки во втором опыте будет равна  $U = 1$  м/с?

3) На каком расстоянии  $L$  от точки старта скорость коробки обратится в ноль во втором опыте? Ускорение свободного падения  $g = 10$  м/с<sup>2</sup>. Все кинематические величины измерены в лабораторной системе отсчета.

3. Санки дважды разгоняют из состояния покоя до одной и той же кинетической энергии  $K$  на одинаковых участках пути.

В первом случае санки тянут, действуя постоянной по модулю силой, направленной под углом  $\alpha$  к горизонту (см. рис.).

Во втором случае такая же по модулю сила, приложенная к санкам, направлена горизонтально. После достижения кинетической энергии  $K$  действие внешней силы прекращается.



1) Найдите коэффициент  $\mu$  трения скольжения санок по горизонтальной поверхности.

2) Найдите перемещение  $S$  санок в процессе торможения до остановки. Ускорение свободного падения  $g$ . Санки находятся на горизонтальной поверхности. Движение санок прямолинейное.


# Олимпиада «Физтех» по физике, февраль 2023

## Вариант 10-02

*Во всех задачах, в ответах допустимы обыкновенные дроби и радикалы.*




4. Тепловой двигатель работает по циклу 1-2-3-1. Рабочее вещество – один моль одноатомного идеального газа. Для вычисления КПД цикла ученик десятого класса построил график зависимости молярной теплоемкости  $C$  газа (в единицах универсальной газовой постоянной) от температуры в процессах: 1-2, 2-3, 3-1 (см. рис.). Температура газа в состоянии 1 равна  $T_1 = 200$  К, универсальная газовая постоянная  $R = 8,31$  Дж/(моль·К).



1) Найдите работу  $A_{31}$  внешних сил над газом в процессе 3-1.

2) Найдите КПД  $\eta$  цикла.

3) Постройте график цикла в координатах  $(P/P_1, V/V_1)$ , где  $P_1$  и  $V_1$  давление и объём в состоянии 1. Для построения графика перенесите шаблон (см. ниже) в чистовик своей работы. Точка 1 на графике соответствует состоянию 1 газа в цикле.



5. Четыре заряженных шарика связаны легкими нерастяжимыми нитями так, что шарики находятся в вершинах квадрата со стороной  $a$  (см. рис.). Сила натяжения каждой нити  $T$ .


1) Найдите абсолютную величину  $|q|$  заряда каждого шарика.

Одну нить пережигают.

2) Найдите кинетическую энергию  $K$  любого, выбранного Вами шарика, в тот момент, когда шарики будут находиться на одной прямой.

3) На каком расстоянии  $d$  от точки старта будет находиться в этот момент любой из двух шариков, изначально расположенных сверху (на рисунке)?

Электрическая постоянная  $\epsilon_0$ . Действие сил тяжести считайте пренебрежимо малым.



На одной странице можно оформлять только одну задачу.

Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице:


1  2  3  4  5  6  7



Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



$\alpha = 45^\circ$   
 $L = 20 \text{ м}$   
 1)  $v_0 = ?$   
 $H = 3,6 \text{ м}$   
 2)  $S = ?$   
 $g = 10 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$



$h_{\text{max}} = H$

1) Воспользуемся формулой для горизонтального перемещения

$$L = v_0^2 \frac{\sin 2\alpha}{g} \Rightarrow v_0 = \sqrt{\frac{Lg}{\sin 2\alpha}} = \sqrt{\frac{20 \cdot 10}{1}} = 2 \cdot 10 \text{ м/с}$$

$v_0 = 2 \cdot 10 \text{ м/с}$

2)  $H = v_0^2 \sin^2 \alpha / 2g$

2) Заметим, что чтобы максимизировать путь высоты точки броску нужно сделать так, чтобы стена находилась в середине горизонтального пути (если только еще и упрощено). Тогда

$$H = \frac{v_0^2 \sin^2 \alpha}{2g} \quad \text{и} \quad S = \frac{v_0^2 \sin 2\alpha}{g}$$

$$\Rightarrow \sin^2 \alpha = \frac{2H}{v_0^2} = \frac{7,2}{200}$$

$$\Rightarrow \cos \alpha = \sqrt{\frac{200 - 7,2}{200}} \quad \sin \alpha = \sqrt{\frac{7,2}{200}}$$

$$\text{Тогда } S = \frac{v_0^2 2 \sin \alpha \cos \alpha}{g} = \frac{2 \cdot 17,2 \cdot (200 - 7,2)}{2 \cdot 10} = \frac{7,2(200 - 7,2)}{10} \text{ м}$$

Ответ:  $v_0 = 2 \cdot 10 \text{ м/с}$  и  $S = \frac{7,2(200 - 7,2)}{10} \text{ м}$



1  2  3  4  5  6  7

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется, Порча QR-кода недопустима!



~ 2

$$\sin \alpha = 0.6 \Rightarrow \cos \alpha = 0.8$$

$$v_0 = 6 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$\mu = 0.5$$

$$1) T = 1 \text{ c}$$

$$u = 1 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$


$$v_0 = 6 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

S - ?

$$2) u = 1 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$3) L - ?$$

$$g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$




Даны:

$$S = 1 \text{ m} \quad n_1$$

$$T = 1 \text{ c} \quad n_2$$

$$L = 2 \text{ m} \quad n_3$$

1) Рассчитаем силы на коробку



Закон Ньютона:

$$N = mg \cos \alpha$$

$$ma = -F_f - mg \sin \alpha$$


т.к.  $v_0 \neq 0$ , то  $g$  можно считать отрицательным:

$$F_f = \mu N$$

$$\Rightarrow a = -( \mu g \cos \alpha + g \sin \alpha ) = -10 \cdot (0.5 \cdot 0.8 + 0.6) = -10 \cdot (0.4 + 0.6) = -10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

$$S = v_0 T + \frac{a T^2}{2} = 6 \cdot 1 - 5 \cdot 1 = 1 \text{ m}$$

2) Чтобы скорость коробки была равна скорости ленты, она должна остановиться в  $\omega$  ленте. Т.е. перестанет действовать сила трения




$$\mu \text{ и } a = -(\mu g \cos \alpha + g \sin \alpha) = -10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

но как двигаться в  $\omega$  ленте.

$$v = v_0 + a T_1 \Rightarrow T_1 = \frac{v_0 - u}{-a} = \frac{6 - 1}{+10} = 0.5 \text{ c}$$

3) Заметим, что после того как коробка получит скорость  $u$  в  $\omega$  ленте ее будет замедлять сила тяжести, а сила трения будет в opposite направлении, т.е. будет разогнать до скорости  $u$  и далее двигаться



$$ma_2 = F_f - mg \sin \alpha = \mu mg \cos \alpha - mg \sin \alpha$$

$$\Rightarrow a_2 = g(\mu \cos \alpha - \sin \alpha) = 10(0.5 \cdot 0.8 - 0.6) = 10(0.4 - 0.6) = -2 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

$$\text{но как } h = \frac{v_0^2 - u^2}{2a_1} + \frac{0 - u^2}{2a_2} = \frac{35}{20} + \frac{1}{4} = \frac{7+1}{4} = 2 \text{ m}$$

На одной странице можно оформлять только одну задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,

решение которой представлено на странице:

1  2  3  4  5  6  7




Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



3  
 $K, \alpha, g, \mu$   
 1)  $M = ?$   
 2)  $S = ?$



1) Т.к. санки разогнаны до скорости  $v$  до начала движения, то при движении вниз  $v$  будет и тогда же и конечная скорость  $v$  одной и той же, т.к.  $K = \frac{mv^2}{2}$ , а  $m = \text{const}$   
 $a = \frac{v^2}{2S} \Rightarrow a$ , ускорение санок одинаково в обоих случаях  
 Рассмотрим силы



Проецируем на ось  $x$  и получим  $F_{sp} = \mu N$ , т.е. сан разогнаны санки  
 $N + F \sin \alpha = mg$   
 $am = F \cos \alpha - F_{sp}$   
 $ma_{\text{max}} = F \cos \alpha - \mu mg + \mu F \sin \alpha$   
 а если одинаково в обоих случаях,  $\Rightarrow F \cos \alpha - \mu mg + \mu F \sin \alpha = F - \mu mg$   
 $F \neq 0, \Rightarrow \mu \cos \alpha + \mu \sin \alpha = 1$   
 $\mu = \frac{1 - \cos \alpha}{\sin \alpha}$

2) После достижения максимальной скорости  $K$  сила  $F$  перестает действовать и санки начинают тормозить. Рассмотрим силы

По закону сохранения энергии:  $K + A = 0$ , где  $A_{\text{тр}}$  - работа трения.  
 $K = \frac{mv^2}{2}$   
 $F_{sp} = \mu N$ , т.к.  $N = mg$   
 $A_{\text{тр}} = -F_{sp} \cdot S = -\mu mg S \Rightarrow S = \frac{K}{\mu mg} = \frac{K}{mg} \cdot \frac{\sin \alpha}{1 - \cos \alpha}$

Отсюда:  $\mu = \frac{1 - \cos \alpha}{\sin \alpha}$  т.е.,  $S = \frac{\sin \alpha}{1 - \cos \alpha} \frac{K}{mg}$  н2

На одной странице можно оформлять только одну задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,

решение которой представлено на странице:

1  2  3  4  5  6  7




Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

4

$T_1 = 200\text{K}$   
 $R = 8,31 \frac{\text{Дж}}{\text{моль}\cdot\text{К}}$   
 $1-2-3-1$   
 $V = 1 \text{ моль, } \nu = 1 \text{ ат}$

- 1)  $A_{31} = ?$
- 2)  $q = ?$
- 3)  $\frac{p}{p_1} \left(\frac{V}{V_1}\right)$



1) По уравнению Клапейрона, что  $T_3 = 4T_1$ ,  $T_2 = 3T_1$ . Т.н. раз  $1 \text{ ат}$ , то  $C_v = \frac{3}{2}R$ .  
 $Q = \Delta U + A$ , где  $A$  - работа газа  $\Rightarrow Q_{31} = \Delta U_{31} - A_{31}$ , т.е.  $A = -A_{31}$ .  
 $Q_{31} = \nu n T_{31} C_v$  по определению температуры.  $\Delta U_{31} = C_v \nu n T_{31}$

$\Rightarrow A_{31} = \nu n T_{31} (C_v - C_{v1}) = 1 \cdot (-600) \cdot (1,5 - 2) \cdot 8,31 \text{ Дж} = 2493 \text{ Дж}$

- 2)  $U_1 = \nu C_v RT_1$   
 $U_2 = C_v \nu RT_2$   
 $U_3 = C_v \nu RT_3$


Заметим, что по уравнению Клапейрона или закону Бойля-Мариотта  $\frac{Q}{R}$  для каждого процесса.

$\frac{Q_{12}}{R} = 7T_1 \cdot 1 \text{ моль} \cdot 1,5 = 7 \cdot 3 \cdot 200 = 4200 \text{ Дж/К}$


$\frac{Q_{23}}{R} = -4T_1 \cdot 1 \text{ моль} \cdot 1,5 = -2 \cdot 200 = -400 \text{ Дж/К}$

$\frac{Q_{31}}{R} = -3T_1 \cdot 1 \text{ моль} \cdot 2 = -6 \cdot 200 = -1200 \text{ Дж/К}$

$q = \frac{Q_r - |Q_c|}{Q_r} = \frac{Q_{12} - (|Q_{23}| + |Q_{31}|)}{Q_{12}} = \frac{4200 - 400 - 1200}{4200} = \frac{13}{21}$



3) Заметим, что в процессе 12  $C = \frac{3}{2}R$ ,  $\Rightarrow V = \text{const}$ . Т.н.  $\nu RT_2 = p_2 V_c = p_2 V_1$



Воспользуемся уравнением политропы

$pV^n = \text{const}$ ,  $n = \frac{C - C_p}{C - C_v}$   
 $n_{23} = \frac{C_{31} - C_p}{C_{31} - C_v} = \frac{0,5 - 2,5}{0,5 - 1,5} = 2 \Rightarrow p_2 V_2^2 = p_3 V_3^2$

$\Rightarrow p_3 = p_2 \frac{V_2^2}{V_3^2} = p_0 \cdot \frac{1}{4} = 2p_1$

т.е. в 123  $p = \frac{C}{V^2}$ , гиперболы

$n_{31} = \frac{C_{31} - C_p}{C_{31} - C_v} = \frac{2 - 2,5}{2 - 1,5} = -1$ , т.е.  $p = C \cdot V$  - прямая

Итого:  $A_{31} = 2493 \text{ Дж}$  и  $q = \frac{13}{21}$  и  $n_2$ , график  $n_3$

Т.н.  $\nu RT_2 = p_2 V_c = p_2 V_1$   
 и  $\nu RT_1 = p_1 V_1 \Rightarrow \frac{p_2}{p_1} = \frac{T_2}{T_1}$   
 $\Rightarrow p_2 = 3p_1$   
 $C_p = R + C_v$  м.е.  $\frac{C_p}{R} = 2,5$   
 $\nu_2 T_2 / R = \nu_3 T_3 / R$   $T_3 = \frac{1}{2} T_2$   
 $\Rightarrow \nu_2 = 2 \nu_3$   $\nu_3 = 2 \nu_1 = 2$



На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи.

решение которой представлено на странице:



1  2  3  4  5  6  7

**МФТИ**

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



5  
1)  $a, T, \epsilon_0$   
2)  $k$   
3)  $d$





1) Заметим, что картина симметрична. Рассчитаем силу на один из зарядов.  $F_2, F_1$  - силы Кулона.  $F_2$  - гравитация по диагонали,  $F_1$  - пружина. Заметим, что ЦМ системы в равновесии,  $\Rightarrow$  он не движется, т.е. шар покоится и ускорения нет.

$\Rightarrow$  по 3 закону Ньютона  $2T \cdot \cos \alpha = F_2 + 2F_1 \cos \alpha$   $\alpha = 45^\circ$   $\cos \alpha = \frac{\sqrt{2}}{2}$

$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q^2}{a^2} \left( \frac{1}{2} + 2\cos \alpha \right) = 2T \cos \alpha$   $q = 2a \cdot \sqrt{\frac{\pi\epsilon_0 2T}{2\sqrt{2} + 1}}$

2) Заметим, что т.е. вышестоящая сила нет, но ЦМ покоится, его ускорения нет скорости 0.  $\Rightarrow$  он будет там же, где и находится. Картина симметрична от AB  $\Rightarrow$  линия проходит через O и AB. Также заметим, что работа гравитации в этой системе ускорение каждого шара направлено по OX и скорость тоже (по вышестоящей) по той же траектории,  $\Rightarrow$  шар покоится  $k=0$



Вышестоящая сила на шар не вышестоящая сила по 1. Вышестоящая  $d = \left( a^2 + \frac{a^2}{2^2} \right)^{1/2} = \frac{a}{2} \sqrt{5}$

Ответ:  $q = 2a \sqrt{\frac{2\pi\epsilon_0 T}{2\sqrt{2} + 1}}$  н1,  $k=0$  н2;  $d = \frac{a}{2} \sqrt{5}$

На одной странице можно оформлять только одну задачу.

Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице:

- 1  2  3  4  5  6  7

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



300


$$\frac{h \cdot \omega^2}{c^2} \quad \frac{\omega^2}{c}$$

$x = 8,31$   
 $\frac{300}{2493}$   
 $v \rightarrow$   
 $\alpha$   
 $L$   
 $g \tau = v \sin \alpha$   
 $\tau = \frac{v \cos \alpha}{g}$

$$L = v \cos \alpha \tau = 2z$$

$$\Rightarrow h = \frac{v^2 \sin \alpha \cos \alpha \cdot 2}{g} = \frac{v^2 \sin 2\alpha}{g}$$

4200



$$S = v \cos \alpha \cdot t \quad t = \frac{S}{v \cos \alpha}$$

$$H = v \sin \alpha \cdot t - \frac{g t^2}{2}$$

$$H = v \cos \alpha \cdot S / v \cos \alpha - \frac{g}{2} \frac{S^2}{v^2 \cos^2 \alpha}$$

$$H' = S \frac{(-\cos \alpha) \cos \alpha - \sin \alpha \cdot \sin \alpha}{\cos^3 \alpha} - \frac{g S^2}{2 v^2 \cos^2 \alpha} \cdot \sin \alpha$$

$$= 0 \quad 1 + \frac{\sin^2 \alpha}{\cos^2 \alpha} = \frac{g S}{4 v^2 \cos \alpha \sin \alpha}$$

$$\frac{\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha}{\cos^2 \alpha} = \frac{-g S}{4 v^2 \cos \alpha \sin \alpha}$$

$$\frac{g S}{4 v^2} = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = -\tan \alpha$$

1600

$$H_{max} \frac{g S}{4 v^2} = S = \frac{4 v^2}{g} \tan \alpha$$

$$6 \frac{m}{c^2}$$

4

$$\frac{4200}{1600} = \frac{26}{26}$$

$$\frac{26}{42} = \frac{13}{21}$$



$$\frac{m v^2}{2} = k$$

v^2

alpha =

Q\_{max}

2cos

$$C = \frac{Q}{V_0 T}$$

$$A_{31} = V_0 T (C - C_0)$$

C/V\_0 T

$$Q = A_{31} C_0 V_0 T$$






На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,  
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,  
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!






На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,  
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,  
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!





На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.  
Отметьте крестиком номер задачи,  
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,  
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

